



ДЕНТИСЕПТ

Хлоргексидин 2 мг/г


ПРИЧИНА ПОСМІХНУТИСЬ

Адгезивна оральна паста для собак та котів



Хвороби пародонту

Захворювання пародонту є загальним терміном, який включає ряд змін, які пов'язані з інфекціями, або запаленням опорних структур зубів, діапазон від гінгівіту до прогресуючого пародонтиту. Це прогресуюче захворювання та найчастіше захворювання у собак та котів. Якщо не лікувати, захворювання пародонту, вони можуть бути дуже болючими, та призвести до місцевих або системних захворювань.



- ▶ **Наліт** - бактеріальні та харчові залишки, що збираються на поверхні зуба.
- ▶ **Зубний камінь** - тверді, коричнево-сірі нашарування на поверхні зубів.
- ▶ **Зубний камінь** - може стимулювати зростання шкідливих мікроорганізмів. **Гінгівіт** є наслідком накопичення бактеріального нальоту. При збільшенні кількості зубного каменю, розмножуються бактерії, що викликають локалізоване запалення.

Хлоргексидин

Всесвітні стоматологічні рекомендації WSAVA ретельно підтримують використання хлоргексидину в догляді за ротовою порожниною. Заявляють, що хлоргексидин показаний у численних дослідженнях для зменшення гінгівіту, при системному застосованні. Як повідомляється, хлоргексидин швидко починає діяти та має мінімальне системне поглинання, що робить його відмінним вибором для антисептики ротової порожнини. Хлоргексидин - має доведену ефективність, як орального антисептику, який зменшує утворення нальоту, особливо при післяопераційному промиванні, або профілактиці. Проте достатній час контакту, не досягається, при промиванні.

Хлоргексидин - добре відомий антисептик, який має широкий спектр антимікробної активності. Він довів свою ефективність проти Гр + і Гр - бактерій, грибків, дріжджів та факультативних анаеробів.

Хлоргексидин зв'язується з білками та емаллю і звільняється повільно, при антисептичному рівні, та створює ефект депо.

Чому ДЕНТИСЕПТ?

▶ Доведена ефективність та якісна адгезія

Відмінний продукт, що містить антисептик хлоргексидин з перевіреною антимікробною дією.

Дентисепт містить не тільки хлоргексидин, а також спеціальну зв'язуючу адгезивну суміш, для забезпечення чудового контакту з яснами та зубами.

- Антисептик, антимікробні та протигрибкові властивості
- Золотий стандарт профілактики та лікування хвороб періодонта

▶ Відмінний смак


Завдяки доданому ванільному ароматизатору смак хлоргексидину замаскований, що призводить до хорошого прийняття домашніми тваринами.

▶ Спеціально розроблена форма для довготривалого ефекту

Спеціально розроблена форма забезпечує надзвичайну адгезію на слизову оболонку порожнини рота, а також зубів.

ДЕНТИСЕПТ зв'язаний з білками емаля, хлоргексидин повільно вільняється протягом 24 годин, забезпечуючи довготривалий ефект депо.

Ефект депо



без захисту



Захист Дентисепт

Використання Дентисепт

Дентисепт може бути використаний у будь-який час, для створення антисептичного середовища в ротовій порожнині:

- Щоденний догляд
- Після стоматологічних оперативних втручань
- Гінгівіт
- Стomatит
- Періодонтит
- Контроль нальоту та з.каменів
- Контроль інф. ротової порожнини

Він також може використовуватися на шкірі і особливо корисний на складках шкіри та міжпальцевому дерматиті, оскільки має відмінну адгезію до шкіри.

ДЕНТИСЕПТ

Хлоргексидин 2 мг/г

Адгезивна оральна паста для собак та котів

ПРИЧИНА ПОСМІХНУТИСЬ



Шлях використання:



Нанести **Дентисепт** після годівлі для максимального ефекту



Для застосування приєднаний аплікатор до туби. Це забезпечує легший доступ в глибину рота



Обережно розподіліть гель пальцем.



Ретельно обробіть поверхні (зуби, ясна).



Дентисепт 2 мг/г. Хлоргексидин 0,2%. Види. Собаки та кішки. Показання. Лікування гінгівітів, нальоту, зубного каменю та дерматиту шкірних складок у собак та кішок. Об'єм для введення. Для лікування в ротовій порожнині рекомендується приєднати аплікатор на тубу. Таким чином, легко досягаються зони в глибині ротової порожнини. Наносити гель розміром з горошину.

Дентисепт ретельно розподіляється за допомогою пальця і обережно втирають. Щоб очистити палець, рекомендується спочатку використовувати суху (паперову) серветку, а потім помити руки. Рекомендується застосовувати Дентисепт один раз на день або щотижня. Дентисепт не слід застосовувати перед годівлею (після годівлі), щоб уникнути швидкого змивання. Термін придатності. 3 роки. Зберігання Не зберігайте при температурі вище 25 ° C.

LIVISTO Int'l S.L.

Avda Universitat Autònoma, 29.
Cerdanyola del Vallès. (Barcelona) Spain.